

全年齢 0歳~成人 ワクチン接種スケジュール

| ワクチン名 | 接種回数 | 接種時期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 20歳 - 59歳 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 | 85歳 | |
| 不活化ワクチン B型肝炎 | 定期 | | ① | ② | | | | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 母親感染予防 3回 | ① | ② | | | | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生ワクチン ロタウイルス | 定期 | | | ① | ② | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1価 2回 5価 3回 | | | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン 肺炎球菌(結合型) (PCV13・15) | 定期 | | | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン 肺炎球菌 (PPSV23) | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン 五種混合 (DPT-IPV-Hib:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ) 四種混合 (DPT-IPV:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ) 二種混合 (DT:ジフテリア・破傷風) 三種混合 (DPT:ジフテリア・百日咳・破傷風) | 定期 | | | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン ポリオ (IPV) | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン ヒブ (インフルエンザ菌b型) | 定期 | | | ① | ② | ③ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン 破傷風トキソイド | 任意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生ワクチン BCG | 定期 | | | | | | ① | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生ワクチン 麻しん・風しん(MR) | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生ワクチン おたふくかぜ | 任意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生ワクチン 水痘(水痘・帯状疱疹) | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生ワクチン 水痘(水痘・帯状疱疹) | 水痘 2回 帯状疱疹 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生ワクチン 帯状疱疹 | 任意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン 日本脳炎 | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン 日本脳炎 | 4回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン インフルエンザ | 13歳未満 2回 13歳以上 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mRNAワクチン 新型コロナウイルス | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン HPV (ヒトパピローマウイルス) | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 定期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9価 9-15歳未満 2回 9歳以上 3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン 髄膜炎菌(4価) | 任意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン 髄膜炎菌(4価) | 1回 (リスクが高い人2回) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン A型肝炎 | 任意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン A型肝炎 | 3回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン RSウイルス | 任意 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不活化ワクチン RSウイルス | 1回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

■ 不活化ワクチン
■ 生ワクチン
■ mRNAワクチン

定期 法律に定められた期間で接種した場合は無料(公費負担)
任意 接種費用は自己負担(自治体によっては接種費用の助成があります)ですが、ワクチンの必要性は定期と同じです

定期接種の推奨期間
 定期接種の可能期間
 任意接種の推奨期間
 任意接種の可能期間



| ワクチン名 | 接種間隔 | 対象者・注意事項 |
|--|---|---|
| B型肝炎 | ①-②の間は4週以上あける、①-③の間は20週以上あける | 定期：0歳で3回接種 1歳以上でも未接種の場合は、早めに接種することを推奨 |
| | ①生直後 ②生後1か月 ③生後6か月 | HBs抗原陽性の母親から生まれたHBs抗原陰性の乳児（健康保険適用） |
| ロタウイルス | 生後6週以降、①は生後8週-15週未満を推奨（遅くとも生後14週6日までに開始） | 定期：1価ワクチン 生後6週から6か月（24週）までに完了する |
| | ・1価ワクチン：①-②は 4週以上あける ・5価ワクチン：①-②-③は 4週以上あける | 定期：5価ワクチン 生後6週から8か月（32週）までに完了する |
| 肺炎球菌（結合型）（PCV13・15） | ・初回接種が生後2か月-6か月：①-②-③の間はそれぞれ27日以上あける、③-④の間は60日以上あけて、1歳から1歳3か月で④を接種 | 定期：生後2か月-5歳の前日まで 任意：高齢者または肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高い人 |
| | ・初回接種が生後7か月-11か月：①、②の接種後60日以上あけて1歳以降に③ ・初回接種が1歳-生後23か月：①-②の間は60日以上あける ・初回接種が2歳-4歳：①のみ | |
| 肺炎球菌（PPSV23） | 定期：65歳の者（成人のワクチン接種スケジュール参照） 任意：2歳以上 | 対象者：(1) 脾臓摘出した人の肺炎球菌予防（健康保険適用）(2) 鎌状赤血球症、脾機能不全、心臓・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液漏等の基礎疾患のある人、免疫抑制剤治療予定者（治療開始まで14日以上の余裕のある場合） |
| | | |
| 五種混合（DPT-IPV-Hib:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ） 四種混合（DPT-IPV:ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ） 二種混合（DT:ジフテリア・破傷風） 三種混合（DPT:ジフテリア・百日咳・破傷風） | ①-②-③の間はそれぞれ20-56日あける ③-④の間は6か月以上あける （標準は③終了後12-18か月の間） | 定期： 1期：生後2か月-7歳半の前日まで （五種混合・四種混合・三種混合・ポリオ） ・五種混合は、2024年4月以降に接種開始の小児に使用 ・二種混合を1期に使用する場合は生後3か月から 2期：11歳-13歳の誕生日前日まで（二種混合） 任意（推奨）：5歳-7歳未満 三種混合ワクチンを追加接種（百日咳予防目的） 不活化ポリオワクチンを追加接種（ポリオ予防目的） ・ポリオワクチン：ポリオ流行地へ行く人 |
| | 11歳-13歳未満 二種混合 二種混合の代わりに三種混合ワクチンを接種可（百日咳予防目的） | |
| ポリオ（IPV） | ①-②-③はそれぞれ20-56日あける ③-④は6か月以上あける （標準は③終了後12-18か月の間） | 任意（推奨）： ⑥ 5歳-7歳未満 ポリオに対する免疫が低下する前の接種を推奨 ・ポリオ流行地へ行く人 |
| ヒブ（インフルエンザ菌b型） | ・初回接種が生後2か月-6か月：①-②-③の間はそれぞれ27-56日、③-④の間は約1年あける ①-③までを12か月までに終了する | 定期：生後2か月-5歳の前日まで 任意：リスクのある患者は5歳以上でも接種可能 注意：ヒブは五種混合ワクチンに含まれています |
| | ・初回接種が生後7か月-11か月：①、②の後は7か月以上あけて③ ・初回接種が1歳-4歳：①のみ | |
| 破傷風トキソイド | ・①のあと3-8週後に②、①の12-18か月後に③ ・10年ごとに1回接種 | ・過去に3回の接種歴がない人 ・3回接種歴がある人は10年ごとに1回接種 注意：1967年以前の生まれの人は定期接種がありません |
| BCG | | 定期：生後12か月未満 標準的には、生後5か月から8か月 |
| 麻しん・風しん（MR） | ①：1歳-2歳の誕生日の前日まで ②：5歳-7歳未満（小学校就学前の1年間） | 定期：①1歳、②年長児相当 風しん第5期：1962年4月2日から1979年4月1日生まれの男性（2024年度末まで） |
| | 任意：1歳以降全年齢接種可能 麻疹曝露後や流行地域では、生後6か月以降で接種可能その場合は接種回数には数えず、①、②は規定通り接種する | |

| ワクチン名 | 接種間隔 | 対象者・注意事項 |
|-------------------------|---|--|
| おたふくかぜ | ①：1歳以降 早期に ②：5歳-7歳未満（小学校就学前の1年間） ①から4週間あければ接種可能 | 任意：1歳以降全年齢接種可能 |
| 水痘（水痘・带状疱疹） | 1歳-3歳未満： ①：1歳以降 早期に ②：①から3か月以上あける 3歳以上：①-②の間は4週間以上あける | 定期：1歳-3歳の誕生日前日まで 任意：1歳以降全年齢接種可能 ・水痘予防目的では、2回の接種歴がない かつ 感染歴のない人：2回 ・带状疱疹予防目的では、50歳以上：1回 |
| | ①-②の間は2か月-6か月あける *リスクが高い18歳以上：①-②の間は1-2か月あける | 任意：50歳以上 リスクが高い18歳以上* |
| 帯状疱疹 | ①-②の間は6日以上（-28日）あける ②-③の間は6か月以上あける ④：9歳-13歳未満 | 定期：1期：3歳-7歳6か月 （自治体によっては生後6か月から開始） 2期：9歳以上13歳未満 |
| | 任意：生後6か月以降全年齢接種可能2005年5月からの積極的勧奨の差し控えを受け、特定対象者（1995年4月2日か2007年4月1日生まれの人）は、20歳の誕生日前日までは定期接種可能 | |
| インフルエンザ | 13歳未満：①-②の間は4週（2-4週）あける | 定期：65歳以上（成人のスケジュール参照） 任意：生後6か月以上の全年齢 |
| 新型コロナ | 製剤ごとに定められている方法 | 年齢によって使用する製剤や投与量が異なる |
| | 最新情報は厚生労働省のホームページなどを参照 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html | |
| HPV（ヒトパピローマウイルス） | ①-②の間は1か月以上あける ①-③の間は6か月以上あける 標準的な接種ができなかった場合、①-②の間は1か月以上、①-③の間は5か月以上、かつ②-③の間は2か月半以上あける | 2価ワクチン 定期：小学校6年から高校1年女性 任意：10歳以上の女性 |
| | ①-②の間は2か月以上あける ①-③の間は6か月以上あける 標準的な接種ができなかった場合、①-②の間は1か月以上、②-③の間は3か月以上あける 9価 9-15歳未満：2回でも可、その場合①-②の間は5か月以上あける | 4価・9価ワクチン 定期（4価）（9価）： 小学校6年から高校1年女性 任意（4価）：9歳以上の男女 任意（9価）：9歳以上の女性 |
| 髄膜炎菌（4価） | ①-②の間は8週以上あける | 任意：2歳以上 (1) 髄膜炎菌感染症流行地域へ渡航する人 (2) 学校の寮などで集団生活を送る人、送る予定の人 (3) マスギャザリングイベントに参加する人 (4) リスクのある患者（HIV感染症、補体欠損症、無脾症など） |
| | | |
| A型肝炎 | ①-②の間は2-4週あける ①-③の間は20-24週以上あける | 任意：全年齢接種可能（WHOは1歳以上を推奨） A型肝炎流行地へ渡航する人 |
| RSウイルス | | 任意：60歳以上 |

